

Võõrliikide mõju kohalikule ökosüsteemile

Võõrliigid on elupaikade kao ja killustumise kõrval suurimaks ohuks kohalikule elurikkusele. Need võivad mõjutada kohalikku ökosüsteemi järgmiselt:

- ✓ konkurents ja kohalike liikide väljatõrjumine – nt signaalvähk tõrjub välja hariliku jõevähi, elegantne garneel kohalikud krevetiliigid, ameerika naarits on mandri-Eestist tõrjunud välja euroopa naaritsa;
- ✓ elupaikade muutmine – nt verev lemmmalts, Sahhalini ja vooljas pargitatar, karuputke võõrliigid, kanada kuldvits kasvavad suurte ja tihedate kolooniatena, tõrjudes välja teised liigid;
- ✓ toiduahelate muutmine (kisklus ja herbivooria) – nt hariliku rändkrabi ja ümarmudila mõju rannikumere põhjaloomastiku arvukusele;
- ✓ haiguste ülekanne – nt signaalvähk kannab endaga kaasas vähikatku, mis on letaalne harilikule jõevähile;
- ✓ on mürgised – nt Sosnovski ja hiid-karuputk;
- ✓ on parasiitide ja haigustekitajate kandjad;
- ✓ tekitavad lähedaste liikidega ristudes hübriide;
- ✓ takistavad tolmeldamist – nt kimalased eelistus tolmeldada verevat lemmmaltsa kohalike taimeliikide ees.

Lisades juurde mõjud majandustegevusele (näiteks kinnisvara väärtuse vähenemine, saagikuse vähenemine) ja inimese tervisele, on võõrliikide teema muutumas maailmas järjest olulisemaks.

Viimati uuendatud 13.02.2025