

Karuputke võõrliigid: märka, teavita, tõrju!

Downloaded 04.11.2025

Handbook updated 14.10.2025

Sisukord

Karuputkede areng 3

Karuputkede areng

Idanenud Sosnovski ja hiid-karuputke seemik on ümara kuni kolmehölmalise lehega, mitmeaastasel karuputkel on leht rohkem lõhestunud.

Karuputkede areng ja õitsema puhkemine sõltub suuresti keskkonnatingimustest. Näiteks võsa vahel varjus kasvades võib karuputk aastaid kiratseda ja püsida küllaltki väiksena, raskelt märgatavana. Tavatingimustel kasvab taim esimesel aastal u 60 cm kõrguseks, teisel aastal u 1,5 m kõrguseks ja kolmandal aastal, mil kõige enam võõr-karuputkedest ka õitseb, kasvab taim juba 3 meetri kõrguseni.

Karuputkede valged õied on koondunud suurtesse sarikatesse. Igast õiest areneb kaks üheseemnelist vilja (seemnis). Ühel taimel võib valmida kuni 100 000 seemet ning need võivad püsida elujõulisena mullas 8–10 aastat.

Enamik seemneid idaneb kevadel, kuid mõned ka suvel või sügisel. See muudab karuputke tõrje keeruliseks, kuna uusi taimi tärkab kogu kasvuperioodi vältel.



Tärgranud seemikud



Täiskasvanud taim
kevadel



Õitsev taim



Sarikas noorte
viljadega



Viljunud taimed



Kuivanud sarikas
üksikute viljadega

SOSNOVSKI JA HIID-KARUPUTK: ARENGUJÄRGUD

Karuputke vöörlükide arengujärgud. Fotod: Keskkonnaamet

Käsiraamatu artikli viimane uuendus 11.03.2025